






DK Brugsanvisning EURneffy® 2 mg næsespray, opløsning i enkelt dosisbeholder adrenalin		B  Hold næsesprayen som vist. Hold næsesprayen med tommelfingeren på stemplets bund og en finger på hver side af dysen. • Undgå at trække i stemplet eller trykke det ind. • Test ikke ved at spraye på forhånd. Hver næsespray indeholder kun én dosis.		 Søg lægehjælp i nødsituationer Søg omgående akut lægehjælp for tæt overvågning af den anafylaktiske episode og eventuel yderligere behandling.	
Inden du får brug for EURneffy, skal du have sat dig grundigt ind i produktet, herunder hvornår og hvordan det skal bruges. EURneffy 2 mg næsespray 		C  Før spidsen af næsesprayen ind i et næsebor, indtil fingrene rører næsen. Hold dysen lige ind i næsen, rettet mod panden. Ret ikke næsesprayen mod næsens inderste eller yderste væg.		 Overvåg patientens symptomer  Hvis symptomerne fortsat bliver værre eller gentager sig efter ca. 10 minutter, eller hvis der opstår en doseringsfejl, så brug en ny EURneffy næsespray til at give endnu en dosis i SAMME næsebor som den første dosis, og søg akut lægehjælp. Om nødvendigt kan du lægge dig ned med fødderne hævet. Hvis dette giver dig åndenød, skal du sætte dig op. Bevidstløse patienter anbringes i aflåst sideleje. Hvis symptomerne ikke forsvinder, bør du om muligt blive sammen med en anden person, indtil lægehjælpen kommer.	
Vent med at følge disse anvisninger, til du er klar til at bruge produktet.		D  Tryk stemplet op med et fast tryk, til det giver efter og sprøjter ind i næseboret.		  Ret ikke næsesprayen mod næsens inderste eller yderste væg.	
A  Tag EURneffy 2 mg næsespray ud af emballagen. Træk i emballagen, så den åbner, og udtag EURneffy 2 mg næsespray.					



ALK-Abelló A/S

Bøge Allé 6-8

2970 Hørsholm, Danmark

Version 1.0 / 09.2025



ALK-Abelló A/S
Bøge Allé 6-8
2970 Hørsholm, Danmark